

Tabell 1 Antropometriske målinger ved inklusjon og ved 15 og 24 måneder blant de 39 barna i intervensjonsgruppen og 20 i kontrollgruppen som fullførte studien.

	Intervensjons grupppen Inkludering n=39	Kontroll grupppen Inkludering n=20	Intervensjons grupppen 15 mnd n=38	Kontroll grupppen 15 mnd n=19	Intervention group 24 mnd n=39	Kontroll grupppen 24 mnd n=20
Alder (mnd), gj.snitt (SD)	6.2 (.9)	6.4 (2.2)	16.1 (2.1)	15.9 (1.4)	26.1 (2.1)	25.3 (2.2)
Kjønn, gutter n (%)	18 (46.2)	12 (60.0)	18 (47.4)	12 (63.2)	-	-
Vekt (kg), gj.snitt (SD)	7.6 (0.9)	7.9 (1.0)	10.2 (1.2)	10,8 (1.3)	12.6 (1.4)	12.8 (1.1)
Lengde (cm), gj.snitt (SD)	67.8 (2.8)	68.5 (2.8)	78.2 (3.1)	80.8 (4.1)	88.2 (3.8)	88.3 (3.5)
Brystmelk ja n (%)	24 (62.1)	12 (60.0)	7 (17.9)	7 (36.8)	2 (5.1)	1 (5.)
BMI (kg/m ²)					16.1 (1.3)	16.5 (1.2)
Vektøkning fra 6 til 24 mnd (g/mo)					246.3 (52.7)	267.4 (60.6)
Bruk av tran (%)			18 (46.2)*	3 (15.0)	19 (48.7)*	3 (15.0)
Bruk av annet vitamin D tilskudd n (%)			8 (20.5)	4 (20.0)	6 (15.4)	0
Gj.snittlig porsj. hjemmelaget grøt per uke og per barn			4.8(5.2) **	0.9 (1.9)	3.0 (3.9)	1.6 (2.4)
Gj.snittlig porsj. industriprod. grøt per uke og per barn			2.0 (4.0)*	5.8(8.3)	0.4 (1.1)	0.7 (2.9)
Gj.snittlig porsj. industriprod. middag per uke og per barn			2.9 (4.1)*	6.3(7.6)	0.6(1.8)	1.8(3.2)
25OHD3 (mol/L) gj.snitt (SD)			75.6 (22.7)	77.0 (25.7)	66.2 (17.2)	62.7 (21.8)
HDL-kol. (mol/L) gj.snitt (SD)			0.81 (0.33)	0.94 (0.32)	1.08 (0.30)*	0.89 (0.24)
LDL and VLDL- kol. (mol/L) gj.snitt (SD)			1.6 (0.5)	1.8 (0.5)	2.0 (0.6)	2.2 (0.4)

Blodlipid konsentrasjoner er vist for blodprøver tatt ved 15 og 24 måneder

* p< 0.05 and **p<0.001 Mann-Whitney-U-test mo=måneder, g/mo= gram/måned

Tabell 2 Forskjeller i blodkonsentrasjon fra 15 til 24 måneders alder.

Stoff	Intervensjonsgruppe N= 32	Kontrollgruppe N= 19	p-verdi¹
25OHD3 mmol/L Gj.sn. (SD)	-7.0 (13.9)	-15.7 (15.4)	0.057
HDL-chol. mmol/L Gj.sn. (SD)	0.29 (0.41)	-0.08 (0.40)	0.002
LDL/VLDL mmol/L Gj.sn. (SD)	0.40 (0.834)	0.34 (0.67)	0.785

¹Mann-Whitney-U-test